Подготовка к УЗ-исследованиям

детский медицинский центр “До 16-ти”

• **УЗИ абдоминальное**

За 2-3 дня до исследования рекомендуется исключить из питания продукты, усиливающие газообразование в кишечнике (сырые овощи, цельное молоко, черный хлеб, бобовые, газированные напитки, а также высококалорийные кондитерские изделия - пирожные, торты).

УЗИ абдоминальное желательно проводить в первой половине дня натощак. Если исследование невозможно провести утром, необходима голодная пауза:
- детям от 0 до 1 года — 2-2,5 часа либо перед очередным кормлением;
- детям от 1 до 3 лет — 3 часа;
- детям с 3-х до 5 лет — голодная пауза не менее 4 часов;
- детям с 5 до 10 лет — 5 часов;
- детям с 10 лет — 6 часов.

Для диагностики мочевого пузыря во время абдоминального УЗИ, ребенку необходимо не мочиться 2-3 часа до исследования.

• **УЗИ желудка**

Исследование проводится строго натощак до 12:00.
Детям от 0 до 1 года необходима голодная пауза 3-3,5 часа (будет пропущено одно кормление);
Детям до 10 лет - 4 часа голодная пауза;
Детям старше 10 лет - 6 часов.

С собой для УЗИ иметь до 0,5 литра негазированной питьевой воды.
УЗИ желудка проводится детям любого возраста.

На УЗИ желудка с водо-сифонной пробой оценивают состояние тканей и перистальтики верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, работу сфинктеров. На процедуру желательно идти после дефекации.

Данное исследование не является альтернативой ФГДС!

• **УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря**
• **УЗИ мочевого пузыря**
• **УЗИ почек с оценкой кровотока**

Исследование проводится при наполненном мочевом пузыре. За 1,5 часа выпить 1-2 ст. воды (негазированной воды), либо не мочиться 5-6 часов (соблюдая при этом нормальный питьевой режим).

Детей до 1 года можно накормить грудным молоком (смесью) или напоить (водой) за 20 минут до исследования.

• **УЗИ гинекологическое (абдоминальным датчиком)**

Исследование проводится при наполненном мочевом пузыре. Перед УЗИ ребенку не мочиться. За 1,5-2 часа до исследования выпить 1-1,5 литра простой питьевой воды.

УЗИ гинекологическое (абдоминальным датчиком) не проводится одновременно с УЗИ абдоминальным, так как они имеют несовместимую подготовку.

• **УЗИ функции желчного пузыря (Ф ЭХО ХГ)**

Исследование проводится строго натощак в утренние часы (в крайних случаях допускается голодная пауза 4 часа).

Перед УЗИ ребенку необходимо принять препарат «Хофитол» (приобретать не нужно, предоставляется врачом-УЗИ).

Данный вид УЗИ проводится с 2-х лет по направлению врача.

Иные виды УЗ-исследований, которые проводятся в Центре «До 16-ти», предварительной подготовки не требуют.